

- Ringleben, H. (1951): Zum Vorkommen des Brachpiepers im westl. Thüringen. Mitt. Thür. Ornith. Jg. 2, Heft 9-10, 38-39.
- Schenk, J. (1951): Etwas über die Verbreitung des Syrischen Buntspechts. Columba, 3. Jg., Heft 3-4, 76-77.
- Taubenberger, H. (1951): Lämmergeier in den Salzburger Alpen. Columba, 3. Jg., Heft 3-4, 90.
- Tratz, E. (1951): Alpiner Schlafplatz vom Gänsegeier. Columba, 3. Jg., Heft 3-4, 53.
- Vertse, A. (1950): For Welcome. Aquila, 51-54, 1944-47, 29-42.
- Wüst, W. (1950): Die Vogelwelt des Ismaninger Teichgebietes. Orn. Abhandlg., Heft 7.
- Zimmermann, R. (1944): Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt des Neusiedlersee-Gebietes. Ann. Naturhist. Mus. Wien, Bd. 54, Teil 1, 1-277.

Anschrift des Verfassers: Kurt BAUER, Wien XVIII, Gontzgassee 86/17

Zunahme und Ausbreitung einiger Vögel am Niederrhein

Von

HEINZ MILDENBERGER

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*): Während eines Aufenthalts im Gebiet der Krickenbecker Seen, in der Zeit vom 26. 5.—9. 6. 1952, verhörte ich bis zu 26 singenden Männchen. Es sangen: Am Hinsbecker Bruch 10, am Schroliksee 7, am Glabbacher Bruch 5 und am Poelvennee 4 Rohrschwirle.

Seggenrohrsänger (*Acrocephalus paludicola*): Seit dem Jahre 1950 sah und hörte ich alljährlich 1—2 ♂ dieses Rohrsängers am Altrhein bei Praest (Krs. Rees). Beobachtungsdaten: 10. 5., 12. 5., 29. 5., 2. 6. 1950. 18. 5., 23. 5., 4. 6., 5. 6., und 21. 6. 1951, 4. 5., und 5. 5. 1952. Biotop: Gemischte Bestände aus 2 Seggenarten (60%), Wasserschwaden (30%) und Flutender Schwaden (10%) mit einzelnen Phragmiteshalmen. Ich halte ein Brutvorkommen für sicher, da am 21. 6. 1951 ein futtertragendes Stück gesehen wurde.

Löffelente (*Spatula clypeata*): Brutvogel in 6—10 Paaren am Altrhein zwischen Bienen, Praest und Grietherbusch — mit 2 ♀ mit Jungen (6 bzw. 5) am 1. 6. 1950 und am 23. 5. 1951. Wahrscheinlicher Brutvogel am Altrhein bei Xanten und auf der Bislicher Insel, dort zahlreiche Mai- und Juni-Beobachtungen in den Jahren 1950 und 1951.

Reiherente (*Nyroca juligula*): Hat auf ihrem Vordringen nach Westen den Niederrhein erreicht. Am 28. und 29. 5. 1952 1 Weibchen mit 6 Jungen auf dem Glabbacher Bruch bei Krickenbeck. Einen mausernden Erpel sah ich dort am 28. 5. und 2. 6. 1952, einen weiteren (denselben?) am 3. 6. auf dem Schroliksee. 2 Erpel beobachtete ich am 13. 5. und 1. 6. 1951 am Alten Rhein bei der Bislicher Insel.

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*): Seit 1950 sicherer Brutvogel auf der Bislicher Insel (1 Paar) und am Altrhein bei Praest (1952: 2 Paare). Nestfunde bzw. kleine Jungvögel 28. 5. 1950 (Bislicher Insel), 23. 5. 1951 und 1. 6. 1950 (Praest). Am 5. 5. 1952 beobachtete ich wiederholte Begattung von 2 Paaren bei Praest. Im Mai 1951 Brutversuch eines weiteren Paares auf ausgebaggertem Gelände am Rheinufer bei Rheinberg (Krs. Moers).

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Landw. H. Mildenberger, Ratingen b. Düsseldorf, Landwirtschaftsschule.